

MỘT SỐ GIỐNG GÀ THẢ VƯỜN

- Gà Rốt – Ri
- Gà Tam Hoàng (Trung Quốc)
- Gà Lương Phượng (Trung Quốc)
- Gà Kabia (Israel); gà Sasso (Pháp)
- Và một số con lai giữa gà Kabia x gà Lương Phượng; gà Lương Phượng x gà Ri



Giống Gà Tam Hoàng

CHUỒNG NUÔI GÀ

- Chuồng làm đơn giản bằng vật liệu rẻ như: tre, nứa, lá cọ, tranh, rạ,... hoặc xây chuồng với mái lợp bằng tôn hoặc ngói. Nuôi 100 gà thả vườn cần diện tích khoảng 15-20m². Sân vườn thả gà 1m²/con.

- Nên làm chuồng sàn bằng tre, gỗ cao 40-50cm so với nền chuồng (nền lán xi măng) để phân gà rơi xuống dưới, tránh bẩn, ẩm ướt và dễ dàng dọn phân.

- Làm chuồng nơi cao ráo, hướng Đông Nam, tận dụng càng nhiều ánh sáng tự nhiên càng tốt

- Xung quanh chuồng phải có hàng rào bao quanh, không được thả rộng gà.

- Chuồng nuôi phải cách ly với nhà ở, không nhốt chung gà trong khu chuồng lợn, trâu, bò và không nuôi chung với ngan, vịt.

- Không để các phương tiện đi lại (xe máy, xe đạp,...) cạnh chuồng gà.

KỸ THUẬT CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

1 Giai đoạn ươm gà con từ 1 ngày tuổi đến 4 tuần tuổi.

• Úm trên lồng:

Kích cỡ lồng: 1m x 2m x 0,9m (kể cả chân đáy 0,4 m) để úm 100 gà con. Đáy lồng làm bằng sắt

wuông 1cm x 1cm, xung quanh chuồng dùng lưới mắt cáo và nẹp tre, gỗ để bao.

• Úm trên nền:

Chất độn chuồng: Dùng trấu, dăm bào rải dày 7-10cm và phun thuốc sát trùng (Benkocid, Han-Iodin). Dùng cát cao 50-70cm để quây gà (15-20con/m²) và nới rộng cát theo thời gian sinh trưởng của gà.

• Sưởi ấm cho gà:

Dùng bóng điện, đèn dầu, than củi để sưởi ấm cho gà.

Đảm bảo nhiệt độ:

Tuần 1: 31-34°C

Tuần 2: 29 – 31°C

Tuần 3: 26-29°C

Tuần 4: 22-26°C

Quan sát phản ứng của gà đối với nhiệt độ để điều chỉnh cho phù hợp.



Gà con 1 ngày tuổi đạt tiêu chuẩn

* Nhiệt độ vừa phải: gà nằm rải khắp đều chuồng, đi lại ăn uống bình thường.

* Nhiệt độ thấp: gà tập trung lại gần nguồn nhiệt, đứng co ro run rẩy hoặc nằm chồng lên nhau thì nên điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo theo tuần tuổi của gà

* Nhiệt độ cao: gà tản xa nguồn nhiệt, nằm há mỏ thở mạnh, uống nhiều nước, nên giảm nhiệt độ cho phù hợp như: tre, nứa, lá cọ, tranh, rạ... hoặc xây chuồng với



-Gió lùa: gà nằm tụm lại ở góc kín trong chuồng.

- Chiều sáng suốt đêm cho gà trong 2-3 tuần đầu để đảm bảo ánh sáng, điều chỉnh nhiệt độ, chống chuột mèo, đồng thời cho gà ăn uống nhiều để đảm bảo nhu cầu phát triển của gà.

• Thức ăn cho gà:

- Ngày đầu tiên chỉ cho gà ăn tấm hoặc ngô nghiền nhuyễn

- Từ ngày thứ 2 trở đi cho gà ăn thức ăn công nghiệp, loại cám hỗn hợp hoặc cám viên dùng cho gà con, tỷ lệ protein thô từ 19-21% và năng lượng 2.800 - 2.900 kcal.

- Cho gà ăn nhiều lần (7-8 lần/ngày) trong ngày, mỗi lần một ít để thức ăn luôn được mới, thơm ngon kích thích tính thèm ăn của gà.



Kỹ thuật nuôi GÀ THẢ VƯỜN



gtz

Tháng 9 - 2008

- Có thể sử dụng thức ăn đậm đặc trộn với thức ăn địa phương hoặc thức ăn hỗn hợp.

Nước uống:

Nhận gà về cho gà nghỉ 10-15 phút rồi cho uống nước có pha đường Glucoza và vitamin C. Chỉ cho gà ăn sau khi đã được uống nước.

Nước uống phải sạch và ấm ở nhiệt độ 16-20°C. Sử dụng máng uống bằng nhựa loại 3,5-4 lít cho 100 gà.

2. Nuôi gà từ 4 tuần đến khi giết thịt:

Sau 4 tuần bắt đầu thả gà ra vườn, thả khi mặt trời đã mọc từ 1-2 giờ. Ngày đầu thả gà ra khoảng 2 tiếng và tăng dần ra những ngày sau để gà quen dần trong vòng một tuần đầu.



Đảm bảo dinh dưỡng cho gà với tỷ lệ protein thô 15-16%, năng lượng 2.800 kcal.

Cần bổ sung thêm thức ăn cho gà vào buổi chiều trước khi gà lên chuồng bằng lúa, tằm...

Trước khi bán 10-15 ngày, vỗ béo cho gà bằng cách cho gà ăn tự do thức ăn hỗn hợp tằm hoặc ngô vàng.



Phòng bệnh	Ngày tuổi	Cách phòng
H5N1 (Trovac)	1	Nhỏ mắt, mũi
Gumboro lần 1	1-3	Nhỏ mắt, mũi
Lasota lần 1	3-5	Nhỏ mắt, mũi.
Chung đậu	7-10	Chung dưới cánh
Gumboro lần 2	10-14	Nhỏ mắt, mũi
Lasota lần 2	18	Nhỏ mắt, mũi.
Niu cat sơn	32-35	Tiêm dưới da
H5N1 lần 2	35	Tiêm dưới da
Tụ huyết trùng	> 45	Tiêm bắp

Sau khi xuất bán đàn gà cần vệ sinh, sát trùng chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi, vườn thả gà.



Thu gom phân, đánh đống ủ kỹ 15-30 ngày để tiêu diệt mầm bệnh.

Để trồng chuồng ít nhất 15 ngày trước khi đưa gà về nuôi mới. Nếu bị dịch bệnh thì phải để trồng chuồng ít nhất 3 tháng.

Thực hiện "5 không"

- Không chăn thả rộng gia cầm.
- Không dậu dịch.
- Không mua, bán gia cầm bị bệnh.
- Không vớt xác gia cầm bừa bãi.
- Không ăn thịt gia cầm bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc